

## PraxisTipps\*

# Endokarditis-Prophylaxe

\* gemäß neuer Leitlinie der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie 2015

### Wer? **Alle Hochrisiko-Patienten**

- Patienten mit Klappenprothese (chirurgisch/TAVI); Klappenrekonstruktion mit Fremdmaterial
- Patienten mit Zustand nach Endokarditis
- Patienten mit angeborenem Herzfehler (cyanotisch /operiert mit residueller Insuffizienz/Shunt)
- CCB: 12 Monate nach LAA-, PFO/ASD-Okkluder-, MitraClip-Implantation

**Wer nicht?** ■ Patienten mit bikuspidaler AoK, Mitralprolaps, verkalkter Ao-Klappenstenose, Klappeninsuffizienz, Schrittmacher/Defibrillator

**Wann?** ■ vor zahnärztlichen/kieferchirurgischen Eingriffen mit Beteiligung der Gingiva, periapikale Region oder Perforation der Mundschleimhaut

■ Eingriffe an Entzündungsherden/Abszessdrainage

**Wann nicht?** ■ oberflächliche Kariesbehandlung, Injektion von Lokalanästhetika, Entfernung Nahtmaterial, Herzkatheter

■ vor urologischen, gastrointestinalen (ÖGD/Colo) oder Atemwegs-Eingriffen, Piercing (steril!)

Standardprophylaxe

2g Amoxicillin p.o. oder i.v., einmalig 30-60 Minuten vorher

Bei Allergie gegen Penicillin oder Ampicillin

600 mg Clindamycin p.o. oder i.v., einmalig 30-60 Minuten vorher

**Herz**

**Gefäße**

**Rhythmus**

**Schrittmacher  
ICD**

**CCB**

Cardioangiologisches  
Centrum  
Bethanien

**Cardio-CT  
MRT**

**Gerinnung**

**Diabetes**