

PraxisTipps*

Phosphodiesterase(PDE5)-Hemmer bei Herzerkrankungen

Präparate: Sildenafil (Viagra®), Tadalafil (Cialis®), Vardenafil (Levitra®), Avanafil (Spedra®)

- Anwendung:**
- Patienten mit erektiler Dysfunktion (ED)
 - bei stabilem Verlauf einer KHK oder Herzinsuffizienz in der Regel sicher
- Vorsicht bei:**
- hochgradiger Aortenklappenstenose, hypertropher obstruktiver Kardiomyopathie
 - Herzinsuffizienz NYHA (III-)IV, instabiler Angina pectoris, Hypotonie, kürzlichem Myokardinfarkt
 - Therapie erst nach kardiologischer Abklärung empfohlen
 - Ko-Medikation mit α -Blockern (z.B. Doxazosin) und nicht-selektiven β -Blockern (z.B. Carvedilol)
 - Nur bei stabiler Dauertherapie („steady state“), Beginn mit kleinster Dosis
- Kontraindikation:** gleichzeitige Anwendung von Nitraten, z.B. Nitro-Spray (NTG), ISDN/ISMN, Pentalong
- Nebenwirkungen:** U.a. häufig Kopfschmerzen, Schwindel, gelegentlich vorübergehend Hypotonie

Herz

Gefäße

Rhythmus

**Schrittmacher
ICD**

CCB

Cardioangiologisches
Centrum
Bethanien

**Cardio-CT
MRT**

Gerinnung

Diabetes